

A gyermekkori cukorbetegség tünetei

Gyermekeknél döntően az úgynevezett 1-es típusú cukorbetegség fordul elő, a tünetek általában erősek és egyik napról a másikra jelentkeznek.

Cukorbetegség gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel súlyos esetben eszmélet-vesztés, orvosi beavatkozás nélkül akár életveszélyes állapot alakulhat ki!

Cukorbetegségre kell gondolni, ha a következő tünetek lépnek fel:

- kínzó szomjúság és sok ivás
- gyakori vizelés, csecsemőknél megszokottnál nehezebb pelenka
- gyors fogyás
- fáradékonyság, koncentráció-zavar, levertség, nyűgösség
- homályos látás
- nehezen múló vagy rendre kiújuló fertőzések, gyulladások

Súlyos vércukorkisiklásra utaló jelek, AZONNALI orvosi beavatkozás szükséges:

- erős zavarodottság, dezorientáltság
- erőltetett légzés, légszomj
- körömlakk-lemosóhoz hasonló lehelet (acetonszag)
- eszméletvesztés

A cukorbetegség diagnózisa vércukorméréssel állapítható meg, a néha ijesztő tünetek pedig a kisiklott vércukorszint rendezését követően gyorsan megszűnnek.



Egy Csepp
Figyelem
Alapítvány

Egyszer élünk.

A cukorbetegség figyelmet követel.

www.egycseppfigyelem.hu

facebook.com/egycseppfigyelemalapitvany

<http://cukkerberg.blog.hu>